6

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления ветеринарии Новосибирской области

_____ О.А. Рожков

«06» декабря 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Временно исполняющий обязанности директора СФНЦА РАН,

_____ И.А. Вахнюк

«30» ноября 2021 г.

Программа биологической безопасности по ящуру для предприятий Новосибирской области, осуществляющих убой животных, предоставленных иным хозяйствующим юридическим лицом, КФХ, ЛПХ (как давальческое сырье)

Новосибирск 2021

I. Область применения

1. Настоящая Программа обозначает базовый комплекс мер, направленных уменьшение биологических угроз по ящуру для предприятий Новосибирской области, осуществляющих убой животных, предоставленных иным хозяйствующим юридическим лицом, КФХ, ЛПХ (как давальческое сырье). Настоящая программа служит основой для формирования индивидуальных программ предприятий с последующим согласованием с государственной ветеринарной службой.

2. Программа устанавливает обязательные требования к организации и проведению мероприятий в случает выявления ящура на предприятиях, осуществляющих убой животных, предоставленных иным хозяйствующим юридическим лицом, КФХ, ЛПХ (как давальческое сырье по ликвидации ящура, предотвращению его возникновения и распространения на территории.

II. Общая характеристика ящура

3. Ящур - высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных, а также мозоленогих животных (далее - восприимчивые животные).

При ящуре крупного рогатого скота течение болезни острое. При доброкачественном течении ящура вначале у животного ухудшается аппетит, замедляется жвачка, усиливается слюнотечение, температура тела поднимается до 40,5-41,5°С. На 2-3-й день на слизистой оболочке ротовой полости (на верхней и нижней губе, беззубом крае нижней челюсти), на языке, на крыльях носа, иногда на носовом зеркале появляются афты (пузырьки), наполненные вначале прозрачной, затем мутной жидкостью.

При генерализации процесса образуются характерные афтозные поражения на сосках вымени, на коже венчика, в межкопытной щели, на мякишах копыт, иногда у основания рогов. Через 12-36ч афты вскрываются. На месте лопнувших афт образуются болезненные эрозии с неровными краями, заживающие через 6-8 дней. Температура тела при появлении афт снижается до нормальной. Вымя чаще поражается у лактирующих коров. На сосках появляются афты, после на их месте

образуются эрозии, затрудняется сдаивание молока. Молоко слизистое, с горьковатым привкусом. Иногда у больных наблюдают маститы, эндометриты и диарею. Удои снижаются на 20-75% и после выздоровления не восстанавливаются полностью.

У овец поражаются в основном конечности. На коже венчика и в межкопытных щелях появляются покраснения, набухания и болезненность. В дальнейшем на этих местах возникают афты, которые разрываются, а на их месте образуются очаги эрозии, что приводит к хромоте. У овцематок при заболевании часто прекращается лактация, на вымени обнаруживаются афты или очаги эрозии небольших размеров. В ротовой полости афты образуются редко, но слюнотечения не бывает. При появлении ящура в период окота наблюдается массовый падеж новорожденных ягнят от поражения сердечной мышцы. Часто ящур у овец протекает в скрытой форме, без резко выраженных симптомов болезни.

У коз болезнь протекает более типично, чаще с образованием небольших афт и очагов эрозии, поражаются слизистая оболочка ротовой полости, кожа конечностей и реже вымя. Слюнотечение выражено слабо. При поражении конечностей козы сильно хромают. Очаги эрозии заживают медленно, общее состояние животных ухудшается, наступает угнетение, пропадает аппетит, температура тела повышается до 41°С и выше. Больные животные чаще лежат. Изо рта исходит неприятный запах, наблюдаются диарея или запоры. Козлята болеют тяжело, отмечается большая летальность.

При миотропной форме ящур может протекать без образования афт. У восприимчивых животных проявляются высокая температура, угнетение, слабость. Гибель восприимчивых животных наступает в течение 1 - 2 календарных дней вследствие миокардита.

У крупного рогатого скота вирусоносительство может длиться до 6 месяцев, у овец и коз - до 12 месяцев.

Первые клинические признаки ящура у свиней характеризуются повышением температуры тела выше 41ºС, скованной походкой, снижением аппетита и

угнетением. На коже венчика, мякиша и межкопытцевой щели регистрируются покраснения, припухлость и болезненность с последующим образованием афт, отделению ороговевших слоев копыта от дермы. В тяжелых случаях у взрослых свиней может происходить отторжение рогового башмака копытец. Иногда (у 10 - 20% свиней) везикулы (эрозии) обнаруживаются на коже коленей, пятачка и на коже перехода пятачка в рыло. Афты образуются чаще на коже подошвенного мякиша и межкопытцевой щели у взрослых свиней, а у молодых животных на коже венчика. Эти поражения вызывают сильную хромоту, боль и лежачее состояние, особенно, если свиней содержат на твердом полу. Однако иногда болезнь трудно обнаружить, когда пораженные свиньи содержатся на мягкой подстилке. Везикулы появляются на коже венчике копытец, на коже межкопытцевой щели, на мякишах копытцев. Могут быть везикулярные поражения на коленях и пятках. Везикулы окружающие копытный венчик часто приводят к отделению ороговевших слоев копыта от дермы. Линия разделения старой и новой роговой стенки постоянно сползает с копыта со скоростью, примерно, 1 мм в неделю, начиная через неделю после разрыва везикул копытного венчика. Зачастую таким образом можно оценить возраст ящурных поражений у свиней. Везикулы могут образовываться и на пятачке. Обычно образуется одна большая везикула на верхней стороне рыла позади назального пятачка. Везикулы на пятачке и рыле, как правило, лопаются при приеме корма и на их месте, образуются эрозии. Многие ветеринарные специалисты и свиноводы, считают, что указанные поражения являются следствием травм о кормушки. При обследовании очага ящура у свиней было установлено, что везикулы на пятачках выявляли только у 5% хряков. Везикулы на языке свиней встречаются достаточно редко, и если они все-таки возникают, то имеют маленькие размеры и заживают очень быстро. У свиноматок часто возникают везикулы на коже вымени и сосков. При легком течение ящура у взрослых свиней через 24 - 48 часов после появления ящура афты прорываются и на их месте образуются эрозии, которые через 1 - 2 недели полностью покрываются эпителием. Ящур у супоросных свиноматок сопровождается абортами и мертворождениями. У новорожденных поросят ящур

протекает в безафтозной форме, характеризующейся массовой гибелью от 60 до 100% в течение 1 - 3 дней. При этом внезапная смерть наступает от миокардита, но без появления везикулярных поражений.

Своевременная диагностика ящура, определение типа и варианта вируса имеют важное значение для быстрой локализации и ликвидации инфекции при первой вспышке заболевания, а также предупреждения его дальнейшего распространения.

Диагноз ставят на основании эпизоотологических данных, клинических признаков болезни, патологоанатомических изменений и результатов лабораторных исследований.

Подозрение на ящур вызывает любое заболевание восприимчивых животных, характеризующееся появлением везикулярной сыпи в ротовой полости, на конечностях и вымени, повышенной саливацией, чмоканьем, затрудненным приемом и пережевыванием корма, а при осмотре ротовой полости — обнаружением афт и эрозий. Кроме того, обращают внимание на хромоту, афты на венчике и в межкопытной щели, иногда спадение рогового башмака, афты на сосках и болезненность последних при доении и сосании (при этом сильно выражен защитный рефлекс). В период угрозы появления ящура необходимо обращать внимание на угнетенное состояние животного, снижение аппетита и секреции молока, повышение температуры тела и др.

Исследуемый материал: у крупного рогатого скота берут стенки созревших не прорвавшихся афт с языка, поджелудочную железу, мышцу сердца. Для исследования на вирусоносительство берут зондом соскобы со слизистой оболочки глотки или пищевода.

Сбор, консервирование и пересылку материалов для лабораторной диагностики ящура проводят в соответствии с действующей инструкцией и методическими указаниями.

В качестве экспресс-метода диагностики в настоящее время широко применяют ИФА и ПЦР.

По результатам лабораторных исследований предприятие считают неблагополучным по ящуру в любом из следующих случаев:

1) положительные результаты (с оценкой не менее чем три креста) в РСК при исследовании патологического материала и определении типа вируса с учетом клинико-эпизоотологических данных;

2) развитие у морских свинок (через 24.,,72 ч после введения им материала) первичных афт, а затем генерализованного процесса, сопровождающегося появлением вторичных афт на языке и подошвенной поверхности передних лапок;

3) развитие парезов и параличей у трех мышат (4...5-дневного возраста) после заражения их патматериалом, а затем их гибель при нормальном физиологическом состоянии трех контрольных животных;

4)наличие генома, специфичного возбудителю (в ПЦР);

5) наличие специфических антител к ящуру.

Ящур у человека возникает очень редко. Заражение происходит при уходе за больными животными, чаще болеют люди с ослабленным организмом или дети при употреблении сырого молока от больных коров. Прогноз чаще благоприятный. Выздоровление наступает через 10... 15 дней.

III. Профилактические мероприятия

4. В целях предотвращения возникновения и распространения ящура юридические лица, являющиеся собственниками (владельцами) убойных пунктов, должны руководствоваться следующими положениями:

соблюдение условий, запретов, ограничений в связи со статусом региона, на территории которого расположено предприятие, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. N 635 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный N 41508), с изменениями, внесенными

приказом Минсельхоза России от 8 декабря 2020 г. N 735 (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62284) (далее - решение о регионализации), а так же требованиям к определенному для предприятия компартмену;

принимать животных для убоя после предварительного согласования с государственной ветеринарной инспекцией, с регистрацией животных в модуле "Меркурий" ФГИС "ВЕТИС";

в плановом порядке, согласованном с госветслужбой, осуществлять дезинфекцию помещений, дорог, транспорта, оборудования, спецодежды и обуви дезинфекционными средствами указанными в п. 28, «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г) по микроорганизмам, отнесенным ко II группе устойчивости, или дезинфицирующими средствами с наличием упоминания эффективных дозировок против ящура в инструкции;

поддерживать наличие и запас дезинфекционных средств, биопрепаратов и средств индивидуальной защиты в объемах, обеспечивающих как текущие плановые расходы, так и внеплановые расходы при возникновении неблагополучия (необходимые на дезинфекцию дорог, транспорта и пр.). В обязательном порядке иметь запас спец.одежды для сторонних специалистов, для внепланового расхода при стирке и ежедневной дезинфекции;

осуществлять мойку и дезинфекцию мелкого инвентаря в производственных помещениях убоя и первичной переработки в трех секционных ваннах с подводкой горячей и холодной воды и емкостями, наполненными дезраствором. Для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников использовать специальные промаркированные емкости;

по окончанию рабочей смены, а также при выявлении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, оборудование, полы, панели, стены, стоки, столы, вешала, крючки, напольный транспорт, емкости подвергать очистке, мойке и дезинфекции соответствующими препаратами;

проводить удаление на территории убойных пунктов бытовых отходов из контейнеров при их накоплении не более чем на 2/3 емкости, но не реже одного раза в день, с последующей дезинфекцией контейнеров и площадки, на которой они расположены. Для обработки контейнеров и других емкостей для сбора бытовых отходов, хранения уборочного инвентаря по уборке территории выделять отдельные оборудованные площадки или санитарные посты;

в производственных и вспомогательных помещениях на территории убойных пунктов проводить плановую обработку от грызунов и насекомых;

для обеззараживания сточных вод от ветеринарных объектов необходимо предусматривать контактные отстойники. Обеззараживание осуществляют в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы» с учетом наличия дезинфектантов и технических средств, вида и устойчивости возбудителя болезни (в данном случае, возбудитель относиться ко II категории устойчивости). При использовании хлорсодержащих препаратов дозу хлора для обеззараживания сточных вод определяют в каждом конкретном случае, исходя из хлоропоглощенности сточных вод, но не менее 100 мг/л при продолжительности контакта 2 часа.

обеспечить сотрудников хозяйства централизованным питанием в рабочую смену. Не допускать занос на территорию хозяйства домашних продуктов питания;

планово повышать квалификацию специалистов ветеринарной службы и специалистов производственной лаборатории;

выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении, противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных действующими нормативными актами;

обеспечить предубойный ветеринарный осмотр животных и ветеринарно-санитарную экспертизу туш и иных продуктов убоя в целях определения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении туш и иных продуктов убоя, а также в целях экстренного принятия своевременных ветеринарно-санитарных мер

по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных. На убойных пунктах предубойный ветеринарный осмотр убойных животных, ветеринарно-санитарную экспертизу, ветеринарное клеймение туш и иных продуктов убоя, полученных от этих животных, шкур, а также выдачу и оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляют государственные ветеринарные специалисты органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии (далее - ветеринарные специалисты). При приемке и перед убоем на убойных пунктах животные подвергаются предубойному ветеринарному осмотру, в том числе поголовной или выборочной термометрии;

иметь в производственных помещениях (отделениях) убоя рабочих мест и помещений для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и ветеринарного клеймения, на которых предусматриваются: дополнительное освещение, обеспечение горячей и холодной водой, обеспечение дезинфицирующими растворами, обеспечить наличие сигнальной системы для остановки процесса убоя при выявлении заразной (особо опасной) болезни, устройства для регистрации выявленных случаев заболеваний животных, емкости для ветеринарных конфискатов, стерилизаторов для инструментов и прочего регламентированного оборудования (микроскоп биологический, компрессориум и пр.);

не допускать к убою больных, подозреваемых в заболевании ящуром находящихся в стадии агонии животных без согласования с госветслужбой;

не допускать до убоя животных, поступивших без ветеринарных сопроводительных документов или при несоответствии указанного в этих документах фактическому наличию и состоянию;

не допускать до убоя животных не прошедших в хозяйствах-поставщиках предубойному ветеринарному осмотру, включающему обязательную термометрию тела;

вывод и вывоз поступивших на убой животных с территории мясокомбинатов и должен быть запрещен;

согласовать необходимое количество точек ветеринарно-мсаниатрного контроля совместно с должностными лицами органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарии перед установкой в убойном цехе боенского предприятия поточно-технологических линий по убою и переработке животных. На боенских предприятиях с поточным процессом переработки животных оборудуют следующие точки ветеринарно-санитарной экспертизы:

- на конвейерной линии переработки крупного рогатого скота и лошадей 4 точки ветеринарно-санитарной экспертизы - для осмотра голов, внутренних органов, туш и финальная;

- на линии переработки свиней - 5 точек ветеринарно-санитарной экспертизы для осмотра нижнечелюстных лимфатических узлов на сибирскую язву (при разделке туш со съемкой шкуры эту точку размещают за участком обескровливания, а при переработке свиней без съемки шкуры или со снятием крупона после опалочной печи, совмещая место осмотра лимфатических узлов на сибирскую язву с точкой осмотра головы), голов, внутренних органов, туш, финальная;

- на линии переработки овец и коз - 3 точки ветеринарно-санитарной экспертизы для осмотра внутренних органов, туш, финальная;

на боенских предприятиях, не имеющих поточных конвейерных линий для переработки животных, ветеринарно-санитарная экспертиза туш проводится на специально выделенных участках подвесных путей, а головы и внутренние органы осматриваются в подвешенном состоянии на рамах с вмонтированными в них крючьями или на столах, которые изготавливаются из нержавеющей стали или других материалов безопасных для пищевых продуктов и обеспечивающих эффективную мойку и дезинфекцию;

туши и другие продукты убоя, подвергнутые ветеринарно-санитарной экспертизе, не должны контактировать с теми продуктами убоя, которые еще не

подвергались ветеринарно-санитарной экспертизе;

все отбракованные по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы продукты убоя, предназначенные для утилизации или уничтожения или же признанные условно годными (использование на пищевые цели после обезвреживания), должны находиться под постоянным ветеринарным контролем;

каждая партия мяса и других продуктов убоя, прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу сопровождается ветеринарным сопроводительным документом в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии;

выпуск мяса и других продуктов убоя в сыром виде запрещается.

При наличии мелких множественных или обширных некротических очагов во многих мышцах (тазовых и грудных конечностей, плечевого пояса и др.), а также при осложненных формах ящура, сопровождающихся гангренозным или гнойным воспалением конечностей, вымени и других органов, тушу и органы направляют на утилизацию

IV. Действия при подозрении на ящур

5. Основаниями для подозрения на ящур являются:

наличие у восприимчивых животных клинических признаков, характерных для ящура;

выявление ящура в хозяйстве, из которого ввезены для убоя восприимчивые животные, в течение 28 календарных дней после дня их ввоза;

наличие контакта восприимчивых животных с больными и (или) переболевшими ящуром восприимчивыми животными за последние 28 календарных дней;

наличие контакта восприимчивых животных с факторами передачи вируса;

выявление антител к неструктурным белкам вируса и (или) антител, не связанных с вакцинацией против ящура (далее - серопозитивные животные);

обнаружение трупов диких восприимчивых животных на территориях,

обеспечивающий возможный контакт с выращиваемыми животными хозяйства.

6. В случае, если среди животных, поступивших на убойные пункты, обнаружены больные животные, животные в состоянии агонии, животные, вынужденно убитые в ходе транспортировки, или трупы животных, выявлены патологанатомические признаки ящура, а также если фактическое наличие животных не соответствует их количеству, указанному в ветеринарном сопроводительном документе, такие животные немедленно помещаются в карантинное отделение до установления диагноза или причин несоответствия с обязательным информирование госветслужбы.

7. В случаях подозрения или выявления ящура убойные животные, поступившие на убойный пункт, изолируются до постановки окончательного диагноза, предпринимаются экстренные ветеринарно-санитарные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии (извещение в течение 24 часов специалистов госветслужбы и государственным органам здравоохранения по месту нахождения боенского предприятия). При выявлении заразных болезней животных после убоя на туши накладываются ветеринарные штампы, свидетельствующие о способе обезвреживания), утилизации или уничтожения;

8. До получения результатов диагностических исследований на ящур на предприятии:

прекращают вывод и вывоз из предприятия животных всех видов и продукции животного происхождения;

прекращают убой восприимчивых животных;

запрещают посещение предприятий посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы;

запрещают въезд и выезд транспортных средств, за исключением специальных транспортных средств и транспортных средств, предназначенных для обеспечения деятельности предприятия.

обеспечивают дезинфекционную обработку и смену одежды и обуви персонала при выходе с территории хозяйства в соответствии с пунктом 26, а также помещений хозяйства по содержанию восприимчивых животных и поверхности транспортных средств при выезде с территории предприятия.

VI. Действия при установление карантина, направленные на ликвидацию очагов ящура, а также на предотвращение его распространения

9. В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина) должны быть указаны перечень вводимых ограничительных мероприятий, срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия, и определены:

место нахождения источника и факторов передачи вируса ящура в тех границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным (далее - эпизоотический очаг);

территория вокруг эпизоотического очага, радиус которой составляет от 1 км и до 5 км от границ эпизоотического очага и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между хозяйствами, расположенными на указанной территории (далее - неблагополучный пункт);

территория, прилегающая к неблагополучному пункту, радиус которой составляет от 5 км до 30 км от границ неблагополучного пункта и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности, хозяйственных, транспортных и других связей между населенными пунктами, хозяйствами, расположенными на указанной территории (далее - угрожаемая зона);

территория, прилегающая к угрожаемой зоне, радиус которой составляет от 5 км до 10 км от границ угрожаемой зоны и зависит от эпизоотической ситуации, ландшафтно-географических особенностей местности и хозяйственных связей (далее - зона наблюдения).

10. Должностное лицо организации, подведомственной органу исполнительной власти Новосибирской области, осуществляющему переданные

полномочия в области ветеринарии, должно проинформировать население и главу муниципального образования о возникновении эпизоотического очага.

11. Решением об установлении ограничительных мероприятий (карантина) вводятся ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне, а также мероприятия в зоне наблюдения.

12. Одновременно, на предприятии проводят мероприятия, как в ящурном очаге

при этом администрация и ветеринарная служба мясокомбината (бойни, убойного пункта) обязаны принять меры, предотвращающие разнос вируса ящура. В этих целях:

организуют очистку от навоза, остатков корма и мусора транспортных средств, на которых перевозились животные, скотобаз, убойного цеха и других производственных помещений, а также инвентаря и подвергают их тщательной дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, эффективных при ящуре;

обеспечивают утилизацию или обеззараживание навоза и каныги биотермическим способом в оборудованных навозохранилищах на территории мясокомбината (бойни, убойного пункта), а также провести обеззараживание сточных вод;

организуют санитарную обработку лиц, принимавших участие в доставке неблагополучных по ящуру партий убойного скота, его убое, переработке полученных продуктов и сырья, проведении работ по очистке, дезинфекции скотобаз и других производственных помещений, а также обеззараживание одежды и обуви людей.

На мясокомбинатах (бойнях, убойных пунктах) по письменному указанию главного ветеринарного врача района (города) немедленно вводят ветеринарно-санитарные ограничения, которыми предусматривают:

прекращение приема для убоя новых партий животных до окончания убоя и переработки всего поголовья животных, имеющегося на предприятии и завершения

необходимых ветеринарно-санитарных мер по обеззараживанию производственных объектов и территории предприятий;

недопущение выпуска с предприятия, каких бы то ни было продуктов и сырья животного происхождения, а также выноса (вывоза) за его пределы отходов и любых предметов в необеззараженном виде;

вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, контаминированных вирусом;

въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства);

посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

оборудование дезинфекционных ковриков или ванн на входе (выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;

обеспечение санитарно-душевой обработки и смены одежды, обуви при входе на территорию и выходе с территории хозяйства, дезинфекции одежды и обуви парами формальдегида в течение 1 часа при температуре +57 - +60 °С, расходе формалина 75 $см^3/м^3$ водного раствора формалина с содержанием 1,5% формальдегида или другими дезинфицирующими растворами с высокой вирулицидной активностью в отношении вируса согласно инструкциям по применению при выходе с территории эпизоотического очага;

проведение дезинфекционной обработки поверхности транспортного средства при выезде с территории эпизоотического очага, в соответствии с пунктом 27;

вся продукция, полученная от убоя восприимчивых животных из эпизоотического очага, в соответствии с Правилами изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. N 310 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2502; 2021, N 3, ст. 597), в течение 7 календарных дней с даты принятия решения об установлении ограничительных мероприятий. Продукция, полученная от убоя восприимчивых животных, должны быть уничтожены в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утверждаемыми в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".

13. Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат все помещения и объекты, с которыми контактировали восприимчивые животные, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.

Транспортные средства подлежат дезинфекции при выезде из эпизоотического очага.

Дезинфекция помещений и других мест, где содержались (находились) восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - предварительная дезинфекция, проводимая сразу после уничтожения восприимчивых животных; второй - текущая дезинфекция, проводимая после механической очистки и мойки помещений, кормушек, поилок; третий - заключительная дезинфекция, проводимая не позднее чем за 3 календарных дня до планируемой даты отмены карантина.

Для дезинфекции должны применяться 3-процентный раствор едкого натра или калия, или 3-процентная серно-карболовая смесь, или 20-процентная свежегашеная известь, или осветленный раствор хлорной извести или гипохлорита натрия, содержащий не менее 3% активного хлора, или 4-процентный раствор формальдегида, или 1-процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства, обладающие инактивирующим действием в отношении вируса согласно инструкциям по применению.

Навоз из предубойных площадок должен ежедневно убираться и складироваться внутри предприятия для биотермического обеззараживания или дезинфицироваться иным способом.

убой восприимчивых животных поступивших из угрожаемых зон проводится в специально отведенные санитарные дни на оборудованных для этих целей убойных пунктах (убойных цехах);

VII. Отмена карантина и последующие ограничения

14. Отмена карантина осуществляется через 28 календарных дней после дня уничтожения последнего восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных действующими Правилами.

15. После дня отмены карантина на территории эпизоотического очага в течение 90 календарных дней запрещается вывоз мяса, не прошедшего обработку для снижения ветеринарных рисков распространения ящура согласно имплементирующего решения комиссии ЕС 2013/417/EU, гарантированно удаляющей возбудителя ящура.

Список использованной литературы

1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии»

2. Приказ Минсельхоза России от 22 января 2016 г. №; 22 «Правила осуществления мониторинга ветеринарной безопасности территории Российской Федерации»

3. Приказ Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157 "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура" Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов" (

4. Приказ Минсельхоза России от 15.07.2002 № 13-5-2/0525 «Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госветнадзора»

5. Приказ от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении правил определения

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»

6. Приказ Минсельхоза России от 19 декабря 2011 г. № 476 "Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)" (зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2012 г., регистрационный № 23206) с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 20 июля 2016 г. N 317 (зарегистрирован Минюстом России 9 августа 2016 г., регистрационный N 43179), от 30 января 2017 г. № 40 (зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2017 г., регистрационный N 45771), от 15 февраля 2017 г. № 67 (зарегистрирован Минюстом России 13 марта 2017 г., регистрационный N 45915), от 25 сентября 2020 г. № 565 (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2020 г., регистрационный № 60518

7. Приказ Минсельхоза России от 17.07.2013 № 282 «Правила определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»

8. Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 551 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации»

9. Приказ Минсельхоза России от 28 декабря 2020 года № 794 «О признании не действующими на территории Российской Федерации правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 г.»

10. Ветеринарно-санитарные правила для специализированных хозяйств (ферм и комплексов). По откорму крупного рогатого скота и выращиванию ремонтных телок., 1983 Главным управлением.э (Утвю, Гл. управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30 августа 1983 года

11. Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госветнадзора (утв. приказом Минсельхоза России 15.07.2002 № 13-5-2/0525)

12. Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура (утв. приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 г. № 157)

13.. Имплементирующее решение комиссии. от 31 июля 2013 г., вносящее поправки в Приложение III Решения 2002/99/ЕС о ветеринарных правилах, которые регулируют производство, переработку, распространение и ввоз продуктов животного происхождении, предназначенных для потребления человеком, и касаются дополнительной обработки, позволяющей устранить некоторые ветеринарные риски, связанные с мясом (2013/417/EU)

14. РД-АПК 3.10.07.01-09 Методические рекомендации по ветеринарной защите животноводческих, птицеводческих и звероводческих объектов "Система рекомендательных документов агропромышленного комплекса Министерства

сельского хозяйства РФ. Рекомендательные документы" (утв. и введены в действие Минсельхоза РФ 29 декабря 2008 г.)

15. РД-АПК 1.10.07.01-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств

16. РД-АПК 3.10.01.11-08 Методические рекомендации по разработке генеральных планов ферм и комплексов по производству молока, говядины и свинины

17. РД-АПК 1.10.01.01-18 Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота

18. РД-АПК 1.10.03.001-00 Нормы технологического проектирования козоводческих объектов

19. РД-АПК 1.10.03.01-11 Нормы технологического проектирования козоводческих объектов

20. РД-АПК 1.10.01.02-10. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота.

21. НТП-АПК 1.10.11.001-00. Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и сенажа

22. НТП-АПК 1.10.07.003-02. Нормы технологического проектирования станций и пунктов искусственного осеменения животных.

23. РД-АПК 1.10.07.06-08. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарно-санитарных утилизационных заводов.

24. РД-АПК 1.10.15.02-08. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.

25. ОСН-АПК 2.10.14.001-04. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

26. РД-АПК 1.10.02.04-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов

27. ОСН-АПК 2.10.14.001-04. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.

28. РД-АПК 1.10.01.03-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота крестьянских (фермерских хозяйств)

26. РД-АПК 1.10.03.02-12 Методические рекомендации по технологическому проектированию овцеводческих объектов

29. РД-АПК 1.10.02.01-13 Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств

30. МУ 39-16 Методические указания по обнаружению вируса ящура методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, 06 июня 2016

31. ГОСТ 29312-92 Антитела и антигены для лабораторной диагностики ящура. Технические условия, Дата введения 1993-01-01

32. ГОСТ 25384-82, Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики ящура,

33. FAA HM FSAW-01-04 Landing Gear Spray For Foot-And-Mouth Disease, 01 июня 2001 Решение об эпизоотической обстановке по ящуру и мерах его профилактики и ликвидации в государствах - участниках Содружества Независимых Государств

34. Караулов А.К. Методические рекомендации О принципах зонирования по ящуру территории Российской Федерации / А.К. Караулов, В.В. Никифоров, Н.А. Власов [и др.] // ФГБУ ВНИИЗЖ. – г. Владимир. – 2014.– 54с.

35. Методические указания по отбору, консервированию и транспортировке проб патологического материала и продуктов убоя для лабораторной диагностики ящура, ФГУ ВНИИЗЖ, 2005

Прошнуровано, пронумеровано, с оригиналом сверено и скреплено печатью ГБУ НСО «Новосибирский областной центр ветеринарно-санитарного обеспечения»

21 листов

_____ С.С. Бабаев

«10» 12 2021 г.

Прошито и пронумеровано

20 листов 30.11.2021

_____ и.о. директора СФНЦА РАН Вахнюк И А.

МП